

ZAPAMIĘTAJ!!!

Kraj, w którym wystąpi ASF, narażony jest na bardzo duże straty ekonomiczne w przemyśle mięsnym oraz hodowli, powodowane upadkami świń, kosztami likwidacji ognisk choroby, a także wstrzymaniem obrotu i eksportu świń, mięsa wieprzowego oraz produktów pozyskiwanych od świń.

Za świnie zabite, poddane ubojowi oraz padłe w wyniku działań nakazanych przez Inspekcję Weterynaryjną przy zwalczaniu ASF przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa.

ZASADY MONITORINGU ASF

- ❖ Powiat kutnowski i łęczycki przynależą do strefy II
- ❖ Próbkę pobierane od świń – w przypadku zwiększonego odsetka padnięć w stadzie oraz w przypadku zaobserwowania objawów klinicznych wskazujących na ASF lub objawów nietypowych;
- ❖ Próbkę pobierane od każdego padłego dzika, w tym dzików zabitych podczas wypadków drogowych oraz każdego odstrzelonego chorego dzika.

CO MOŻNA ZROBIĆ, BY ZAPOBIEC ROZPRZESTRZENIANIU ASF?

- ❖ nie skarmianie zwierząt paszą **niewiadomego pochodzenia** ani produktami (w tym zlewkami, resztkami) pochodzenia zwierzęcego;
- ❖ zastosowanie **mat dezynfekcyjnych**;
- ❖ zabezpieczenie przed dostępem zwierząt dzikich (**zwłaszcza dzików**) do budynków inwentarskich i pasz;
- ❖ **ograniczanie dostępu osób postronnych do zwierząt**, szczególnie osób przebywających w ostatnim czasie na terenie Rosji, Białorusi, Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii;
- ❖ nie wprowadzać do gospodarstwa **zwierząt niewiadomego pochodzenia** – bez świadectwa zdrowia.



INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ DOTYCZĄCA AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASF)



POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W KUTNIE

UL. SIENKIEWICZA 25
99-300 KUTNO
tel./fax. (24) 253 35 49

e-mail: kutno.piw@wetgiw.gov.pl

www.piw-kutno.bip.org.pl

JAK ROZPOZNAĆ ASF U ŚWIŃ?

U świń mogą pojawić się następujące objawy:

- **liczne upadki (obserwuje się również padnięcia dzików);**
- **wysoka gorączka (40,5°C – 42,0 °C);**
- **sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała,**
- **drobne, lecz liczne wybroczyny w skórze;**
- **duszność, pienisty wyptyw z nosa; wyptyw z worka spojówkowego;**
- **biegunka, często z domieszką krwi,**
- **wymioty;**
- **niedowład zadu;**
- **objawy nerwowe w postaci podniecenia, drgawek mięśni i skurczów klonicznie - tonicznych;**
- **ronienia.**



CO TO JEST AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ?

Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnię domowe oraz dziki.

Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF w związku, z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia.

Najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi. W przypadku terenów o wysokim zagęszczeniu gospodarstw utrzymujących świnię, rozprzestrzenianie się wirusa między gospodarstwami jest stosunkowo łatwe za pośrednictwem osób odwiedzających gospodarstwo, jak również przez zakażoną paszę, wodę, wyposażenie oraz skarmianie zwierząt odpadami kuchennymi (zlewkami).

W Polsce od dnia 17 lutego 2014r. do dnia 30 października 2015r. stwierdzono 77 przypadków ASF u dzików oraz 3 ogniska ASF u świń – wszystkie zlokalizowane w pobliżu granicy z Białorusią.

Liczne przypadki ASF u dzików i świń zanotowano również we Włoszech, Rosji, Białorusi, na Ukrainie, Litwie, Łotwie i Estonii.

PODEJRZEWASZ WYSTĄPIENIE ASF U ŚWIŃ?

Posiadacz zwierząt, który zauważył objawy nasuwające podejrzenie choroby zakaźnej, jest zobowiązany do **natychmiastowego** zgłoszenia podejrzenia choroby (obowiązek ustawowy obwarowany sankcją karną*). Zgłoszenie należy przekazać do powiatowego lekarza weterynarii bezpośrednio albo za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem lub właściwego miejscowo organu samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza).

ZGŁOSIŁEŚ PODEJRZENIE ASF – CO DALEJ?

Po dokonaniu zgłoszenia - do czasu przybycia urzędowego lekarza weterynarii - posiadacz zwierząt zobowiązany jest do:

- ❖ izolacji i strzeżenia w gospodarstwie wszystkich przebywających tam zwierząt;
- ❖ wstrzymania się od wywożenia, wynoszenia i zbywania produktów z gospodarstwa,
- ❖ uniemożliwienia dostępu osobom postronnym do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta podejrzane o zakażenie lub chorobę